

dziennik  
czytelnictwo: 71047  
powierzchnia: 156 cm<sup>2</sup>  
AVE: 2804 zł



## Zamiast amunicji – papier toaletowy

Wielka „bitwa na srajrolki” to jeden z żelaznych punktów programu obchodów Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ), który przypadak w niedzielę 19 maja. Jest to inicjatywa organizacji pacjentów w wielu krajach świata zrzeszających osoby zmagające się z **chorobą Leśniowskiego-Crohna** oraz **wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego**.

Łódzkie obchody przygotowane zostały przez Towarzystwo J-Elita, które wspiera osoby z NZJ. Odbędzie się 19 maja o godz. 12 w Atlas Arenie. Zaplanowano występy zespołów tanecznych i naukę samby dla wszystkich

uczestników. Będzie także kącik plastyczny dla dzieci, w którym będą tworzone stroje z papieru toaletowego.

W trakcie imprezy zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna Wielkopolskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego - Crohna pt: „NADzwyczajne ŻYCIE”.

Tego samego dnia Towarzystwo J-Elita planuje również premierę spotu promującego koncert charytatywny pt. „W kupie siła!” który odbędzie się w Teatrze Muzycznym. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie wielka bitwa na papier toaletowy.

Na całym świecie na NZJ cierpi ponad 5 milionów osób. W Polsce liczba chorych jest szacowana na 50 tys. Choroba dotyczy głównie ludzi młodych, będących w pełni aktywności zawodowej, w tym również dzieci i młodzież. Schorzenia te ze względu na objawy – częste i niespodziewane biegunki – negatywnie wpływają na wiele aspektów życia chorych, w tym na sferę społeczną, psychologiczną oraz finansową.

Nieswoiste zapalenia jelita to grupa przewlekłych chorób, do których zaliczamy: m.in. **wrzodziejące zapalenie jelita grubego** oraz **chorobę Leśniowskiego-Crohna**.

Szacuje się, że w Polsce na **chorobę Leśniowskiego-Crohna** cierpi około 10-15 tys. osób, natomiast z **wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego** zmagają się od 35 do 40 tys. chorych. Najczęściej na NZJ zapadają osoby między 20. a 40. rokiem życia. Obserwuje się także wzrost zachorowań u małych dzieci. Charakterystycznymi objawami choroby są: wycieńczająca długotrwała biegunka, bóle brzucha o charakterze kolki, utrata masy ciała, gorączka. W trakcie rozwoju choroby mogą wystąpić groźne powikłania. Często konieczna jest interwencja chirurgiczna.